

Se realizó una prueba rápida de detección de anticuerpos contra la hepatitis C: Su resultado es no reactivo/negativo para anticuerpos.

Esto significa:

- Probablemente no tiene infección por el virus de la hepatitis C.
- Su resultado no reactivo no es una protección contra infección por hepatitis C en el futuro.

Qué debe hacer ahora:

Si ha participado en conductas de riesgo en los últimos 6 meses:

- Repita la prueba en unos cuantos meses.
- Su cuerpo puede tomar hasta 6 meses para producir suficientes anticuerpos para ser detectados por la prueba.
- La hepatitis C se transmite por contacto con sangre de una persona infectada. Usted está en riesgo de contraer la hepatitis C si tuvo contacto con la sangre de una persona infectada en los últimos 6 meses (compartió equipo de inyección, tuvo relaciones sexuales bruscas, sin protección, etc.)

Manténgase negativo. Protéjase.

No comparta

- No comparta agujas ni otro tipo de equipo de inyección (algodón, artículos para calentar drogas, etc.) o cualquier cosa, incluyendo hojas de afeitar u otros artículos de cuidado personal que puedan estar contaminados con sangre.

Piense antes de hacerse un tatuaje.

- No se haga tatuajes, perforaciones ni arte corporal en lugares, tales como cárceles, la calle o en la casa de alguien. En cambio, vaya con un artista autorizado para que se los haga.

Tome decisiones saludables.

- Asegúrese de estar vacunado contra la hepatitis A y la hepatitis B.
- Coma alimentos saludables (limite el consumo de azúcar, sal y grasa), haga ejercicio y descanse lo suficiente.
- Practique sexo más seguro: realícese pruebas de enfermedades de transmisión sexual y VIH, y reciba tratamiento si es necesario; use condones u otros métodos de barrera (diques dentales, guantes).
- Incluso si no tiene hepatitis C, debe visitar regularmente a su médico.

Entérese más sobre la hepatitis C.

Manténgase negativo. Protéjase.