

Profilassi farmacologica
di emergenza per la
prevenzione dell'HIV
a seguito di esposizione

Se si necessita di PEP e non si è dotati di copertura sanitaria (assicurazione medica o privata), fare riferimento direttamente al pronto soccorso (Emergency Department).

A New York City sono presenti numerose opzioni per l'accesso alla PEP a costo ridotto. Fare riferimento alla mappa per la salute di NYC:
<https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYHealthMap>.

PEP
COME PREVENIRE
L'HIV

Per le località in cui tali servizi sono offerti, selezionare dal menu dei servizi a sinistra:

- Sexual Health Services (Servizi per la salute sessuale)
- PrEP e PEP
- Scala progressiva di pagamento per persone senza copertura assicurativa
- PEP gratuita per persone senza copertura assicurativa



Department
of Health

I 4 PUNTI PEP PER LA PREVENZIONE DELL'HIV

1.

Se avete consumato rapporti sessuali o condiviso un ago con soggetti affetti da HIV o il cui status HIV è sconosciuto

2.

e se l'esposizione si è verificata nelle ultime 72 ore

3.

un farmacista di questa farmacia

4.

può farvi iniziare una terapia che vi aiuti a proteggervi dall'HIV.

Dal momento che la PEP deve essere avviata immediatamente, vi consigliamo di rivolgervi ad una farmacia poiché:

- Le farmacie sono spesso vicine e aperte con orari prolungati;
- Le farmacie hanno a disposizione i farmaci per la PEP;
- I farmacisti sono persone formate ed attente che possono aiutarvi mantenendo la riservatezza;
- Se siete preoccupati per la riservatezza, potete chiedere di parlare con il farmacista in privato.

La PEP può prevenire l'HIV quando il farmaco viene somministrato il più presto possibile e assunto ogni giorno per 28 giorni.

- Il farmacista può iniziare la somministrazione del farmaco e dotarvi di una fornitura per 7 giorni;
- Il farmacista spiegherà che è importante fissare un appuntamento con la propria struttura sanitaria di riferimento;
- È possibile recarsi presso la propria struttura sanitaria di riferimento. In alternativa, il farmacista può fissare un appuntamento con una struttura sanitaria a nome del richiedente.

Se decidete di avviare la PEP in farmacia, il farmacista vi aiuterà a fissare un appuntamento con una struttura sanitaria il prima possibile, entro 1-3 giorni.

La struttura sanitaria:

1. Valuterà la vostra esposizione all'HIV;
2. Vi offrirà di svolgere un test per l'HIV;
3. Deciderà se prescrivervi il trattamento per tutti i 28 giorni della PEP per HIV;
4. Valuterà la vostra possibile esposizione all'epatite B e C e vi fornirà indicazioni se necessario;
5. Vi consiglierà sull'assunzione di tutti i farmaci prescritti.

Informazioni sulla profilassi Pre-esposizione (PrEP).

Se è stata utilizzata con successo la PEP a seguito di una passata esposizione e si desidera proteggersi dall'HIV in futuro, è possibile prendere in considerazione la profilassi pre-esposizione (PrEP). Se il test HIV è negativo, la PrEP potrà costituire un'opzione per la prevenzione.

Parlare della PrEP con la vostra struttura sanitaria di riferimento o:

- Visitare una clinica per malattie sessualmente trasmissibili di New York (New York City Sexual Health Clinic) (solo per i residenti nel NYS): <https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator>
- Fare riferimento all'elenco dei fornitori di PrEP del NYS per localizzare i fornitori nel NYS e in tutto il paese: www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/