

尚未投保?

如果您尚未投保，也可以接受筛查。
New York State Cancer Services Program（癌症服务计划）为纽约各郡县和行政区尚未投保但符合资格居民免费提供结肠直肠癌筛查。

请联系当地 Cancer Services Program 或拨打 **1-866-442-2262**，查找附近的计划。

了解

结肠 直肠癌



您还可考虑通过 New York State of Health 参加健康计划。如需了解更多信息，请拨打帮助热线 **855.355.5777** 或访问：nystateofhealth.ny.gov

结肠直肠癌的筛查方式不止一种。

请咨询医疗服务提供者。

无论选择哪种检测，接受检测绝对是明智之选。



Cancer Services Program

Department of Health 计划



Department of Health



所有年满 45 岁者均应接受结肠直肠癌筛查。

结肠直肠癌 筛查 类型

在家采集大便样本做检测

- 有 3 种居家检测方式：
粪便免疫化学检测 (FIT)、FIT-DNA 检测 (或粪便 DNA 检测) 或粪便潜血检测 (FOBT)
- 您可在家采集大便样本，然后将大便样本寄到医生办公室或实验室进行检测。
- 检测结果将显示大便中是否含隐血。
- 如果检测出大便中有隐血，则需要接受**结肠镜检查**以找到出血原因。
- 这些检测非常安全且易于完成。无需请假。
- **FIT 和 FOBT** 每年做 1 次。**FIT-DNA** 每 3 年做 1 次。

结肠镜检查

- 结肠镜检查在医生办公室或其他医疗机构处进行。
- 医生会检查直肠和结肠段是否有异常增生（息肉）或癌症。
- 如果检查期间发现息肉，可对其进行切除。这有助于预防癌症。
- 您需要使用药物，确保在检查中更加舒适或处于睡眠状态。
- 如果检查结果没有问题，结肠镜检查可每 10 年做 1 次。否则，医生会向您告知需要接受哪些进一步检测。

可屈性乙状结肠镜检查

- 可屈性乙状结肠镜检查在医生办公室或其他医疗机构处进行。
- 医生会检查直肠内部和结肠末端是否有异常增生（息肉）或癌症。
- 此项检查每 5 年做 1 次；或者每 10 年做 1 次，另外每年做 1 次 FIT。

您知道吗.....

- 结肠直肠癌是死亡人数第 2 高的癌症，但其致死率本可降低。
- 筛查可及早发现结肠癌筛查，以便获得最佳疗效。
- 检测能发现异常增生（息肉），以便在它们转变成癌症之前将其切除。
- 结肠直肠癌或息肉可能没有症状，特别是在早期。切勿等到有症状时才接受检测。

请咨询医疗服务提供者，并选择合适的筛查方式。