

Фармацевтическое средство
для неотложной помощи
при ВИЧ (ПКП)

ПКП
для профилактики
ВИЧ

Если вам необходим доступ к ПКП, но у вас нет медицинской страховки (Medicaid или частное страхование), вам следует обратиться в отделение неотложной помощи.

Если вы находитесь в Нью-Йорке, существуют другие варианты получить доступ к ПКП. Посетите карту здравоохранения Нью-Йорка: <https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYHealthMap>.

В меню услуг слева выберите районы, которые предлагают такие услуги:

- услуги по охране сексуального здоровья,
- ДКП и ПКП,
- подвижная шкала для лиц, не имеющих страховки,
- бесплатная ПКП для лиц, не имеющих страховки.

4 ПУНКТА ПКП ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ

1.

Если у вас был половой контакт или вы пользовались одним шприцем с ВИЧ-инфицированным, или с человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен...

2.

и этот контакт произошел в течение последних 72 часов,

3.

квалифицированный фармацевт в этой аптеке...

4.

может начать ваше лечение, чтобы помочь вам защититься от ВИЧ.

Поскольку ПКП необходимо начать как можно раньше, аптека является хорошим местом, куда можно обратиться, поскольку:

- аптеки часто находятся поблизости и открыты в течение продолжительного времени;
- в аптеках на складе есть препараты для ПКП;
- фармацевты обучены помогать людям и могут оказать свои услуги конфиденциально;
- если вас беспокоит вопрос конфиденциальности, вы можете попросить поговорить с фармацевтом в частном порядке.

ПКП может предотвратить заболевание ВИЧ, если прием лекарственного препарата был начат как можно раньше и выполнялся каждый день в течение 28 дней.

- Фармацевт может начать ваше лечение и обеспечивать вас препаратом для профилактики в течение 7 дней.
- Фармацевт объяснит, почему необходимо проконсультироваться у врача, вы.
- Если у вас есть свой лечащий врач вы можете прийти к нему на прием или фармацевт может записать вас на консультацию к врачу.

Если вы решите начать ПКП в аптеке, фармацевт будет работать с вами и поможет вам записаться на прием к врачу как можно скорее, в течение 1–3 дней.

Врач выполнит следующее:

1. Оценит риск инфицирования ВИЧ.
2. Предложит вам пройти тестирование на ВИЧ.
3. Примет решение о необходимости выписать рецепт для продолжения приема препарата в течение всех 28 дней для ПКП ВИЧ.
4. Оценит возможность заражения гепатитом В и С и, при необходимости, назначит лечение.
5. Проконсультирует вас относительно приема всех препаратов в соответствии с рецептом.

Информация о доконтактной профилактике (ДКП).

Если применение постконтактной профилактики (ПКП) в этот раз прошло успешно и вы хотите защитить себя от ВИЧ в будущем, вы можете рассмотреть возможность применения доконтактной профилактики (ДКП). Если при тестировании на ВИЧ будет получен отрицательный результат, вариант ДКП будет подходящим для вас способом профилактики.

Проконсультируйтесь со своим врачом о ДКП или

- посетите клинику сексуального здоровья в Нью-Йорке (для жителей Нью-Йорка) (solo per i residenti nel NYS):
<https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator>
- просмотрите список специалистов по ДКП в Нью-Йорке, чтобы найти специалиста в Нью-Йорке или штате:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/